



RGT BOSTON

- Riche en tanins. Les tanins limitent la dégradation des protéines dans le rumen. Ces protéines sont ainsi valorisées en plus grande quantité dans l'intestin.



RGT BOSTON

IDENTITÉ

DURÉE D'EXPLOITATION 4 ANS



ASSOCIATIONS POSSIBLES

En association ses performances seront renforcées :

- RGA 2n (8 kg/ha) + RGA 4n (10 kg/ha) + Trèfle blanc (3 kg/ha) + RGT BOSTON (0,5 kg/ha)



DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE
0,5 à 1 kg en association
multi-espèces



PROFIL VARIÉTAL

QUALITÉ ALIMENTAIRE SOURCE HERBE BOOK

% de MS

21%

POINTS FORTS DE LA CHICORÉE FOURRAGÈRE

- Capacité à résister à la sécheresse par un système racinaire pivotant
- Riche en tanins. Cela limite la dégradation des protéines dans le rumen pour une meilleure assimilation dans l'intestin.
- Très appétent

LIMITES

- Gestion des repousses. La chicorée est très remontante. Attention au sur-pâturage
- Utilisation limitée au pâturage

CRITÈRES DE CHOIX DES VARIÉTÉS

- Remontaison
- Tolérance sécheresse