



RGT LIBIA



Une variété reconnue qui ne craint pas le froid

- Haut niveau de rendement fourrager
- Résistante au froid (-15°C)
- Bon état sanitaire (Anthracnose)
- Particulièrement adaptée pour faire un mélange méteil d'hiver



PRODUCTION
D'AZOTE



PRODUCTION
DE BIOMASSE

RGT LIBIA

Une variété reconnue
qui ne craint pas le froid

IDENTITÉ

TYPE

HIVER

DURÉE D'EXPLOITATION

< 12 MOIS



ASSOCIATIONS POSSIBLES

- Association possible avec du RGI, des céréales (triticale / avoine / blé), d'autres légumineuses (pois fourrager, pois protéagineux, trèfles annuelles) pour une exploitation sur moins d'un an.




DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE

- 80 kg/ha en pur en semis précoce, jusqu'à 100 kg/ha en semis de printemps.
- 40 à 50 kg/ha en association avec 80 à 100 kg/ha de céréales

PMG
45 g

Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés par RGT SEMENCES. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. En tout état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient engager RGT SEMENCES contractuellement. Crédits photos : photothèque RGT Semences. 12/2024. think SOLUTIONS think RGT : pensez SOLUTIONS, pensez RGT.



PROFIL VARIÉTAL

PERFORMANCE ÉLEVAGE

- Port dressé avec un feuillage à fort développement, générant un haut niveau de rendement fourrager
- Bonne tolérance au froid hivernal et à l'antracnose
- Bonne vigueur en sortie d'hiver

TOLÉRANCE MALADIES SOURCE RGT

anthracnose

Bonne tolérance

AGRONOMIE SOURCE RGT

démarrage au printemps

Discret l'automne et explosif au printemps

bonne tolérance au froid

jusqu'à -15° C

CONSEILS SEMIS

- Variété alternative qui permet des semis d'octobre en zone froide et des semis de novembre en zone de plaine. Semis possible jusqu'à fin mars.
- Semer tôt à une profondeur de 2-3 cm.
- Recommandée sur sols filtrants, humifères à tendance acide. Éviter les PH trop basiques. Avertissement : le pâturage de la vesce n'est pas conseillé. À un stade avancé, la vesce peut présenter des risques de toxicité pour les ruminants.